

# FUEGO

**AMINOÁCIDOS PARA FERTIRRIGAÇÃO  
REGENERADOR DE SOLOS**

**pH: 4,2**



## Caraterísticas

FUEGO é um bioestimulante à base de aminoácidos formulado sobre um soro láctico que contém naturalmente Lactobacillus. Os componentes de FUEGO melhoram o estado fisiológico da planta, regenerando a microflora e a microfauna benéficas do solo e favorecendo o desenvolvimento das raízes, o que se traduz num maior **VIGOR** da planta, que favorece a sua defesa contra os agentes patogénicos do solo.

Por ser totalmente natural, não deixa resíduos. Pode ser utilizado em doses elevadas e sem limite de tempo de segurança.

## Riqueza garantida

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Aminoácidos livres ..... | 6,0% p/p |
| Azoto total (N) .....    | 0,9% p/p |
| Azoto orgânico (N) ..... | 0,9% p/p |

AMINOGRAMA: Glicina

Contém também: Lactobacillus .....  $6 \times 10^4$  U/g

## Dosagem e instruções de utilização

O produto deve ser sempre aplicado no solo dissolvido na água de rega, independentemente do sistema de rega utilizado para as culturas. A máxima eficácia obtém-se com aplicações fraccionadas, que devem coincidir com os períodos de desenvolvimento radicular ativo, de modo a aproveitar o valor nutritivo total.

### HORTÍCOLAS

**1ª aplicação (antes da transplantação):** 10 - 15 L/ha.

**2ª aplicação (após 6 semanas):** 5 L/ha.

Nas culturas de ciclo longo, efetuar mais uma aplicação de 5 L/ha.

## Dosagem e instruções de utilização

### ÁRVORES DE FRUTO E CITRINOS

1ª aplicação (antes da germinação primaveril): 10 - 20 L/ha.

2ª aplicação (no início da germinação estival): 10 L/ha.

### PLANTAS ORNAMENTAIS E FLORESTAIS

**Dose geral:** 10 - 20 L/ha/aplicação.

Contentores e culturas intensivas: 10 - 15 cc/planta.

Repetir a mesma dose quando necessário.

### BANANA E PLANTAS TROPICAIS

A dose geral é de 10 - 15 L/ha. A primeira aplicação no início da primavera e a seguinte 5 semanas mais tarde. Uma terceira aplicação pode ser efectuada no final do verão.

### VINHEDO


Uma primeira aplicação após a transplantação de 8 cm<sup>3</sup>/árvore. Efetuar uma segunda aplicação após 50 dias de 8 cm<sup>3</sup>/planta e, se necessário, uma terceira aplicação no verão de 4 cm<sup>3</sup>/planta.

Aquando da replantação, efetuar duas aplicações de 12 - 15 cc/planta (25 - 30 L/ha): a primeira na primeira rega e a segunda após 50 dias.

## Precauções

FUEGO é compatível com os pesticidas mais utilizados, exceto com os muito alcalinos.

## Apresentação



AGRICULTURA ECOLÓGICA

Produto utilizável na agricultura biológica de acordo com o Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos.

Inscrito na lista FiBL Input List (Espanha). Produto adequado para utilização no âmbito da Norma de certificação Demeter/Biodinâmica.