

# KENPYR



**INSECTICIDA À BASE DE PIRETRINAS  
NATURAIS**

**CONCENTRADO EMULSIONÁVEL**



## Caraterísticas

O KENPYR é um inseticida de largo espectro à base de piretrinas naturais para o controlo da mosca branca e dos afídeos. É formulado com uma base de óleos vegetais, principalmente óleo de soja, que aumentam a sua atividade inseticida.

O KENPYR tem uma ação preferencial por contacto e, em menor grau, por ingestão. Tem uma ação rápida e uma persistência curta. Para a sua aplicação, toda a planta deve ser bem molhada, de preferência ao anoitecer ou em horas de pouca luz solar.

A sua utilização é recomendada em programas de controlo integrado e em alternância com outros produtos para a gestão da resistência. Também é recomendado na agricultura biológica. Produto isento de butóxido de piperonilo.

## Riqueza garantida

Extrato puro de piretrinas naturais ..... 2,14% p/p (20 g/L)

## Dosagem e instruções de utilização

Aplicar o produto no início da infestação.

Aplicar por pulverização com trator ao ar livre, e por pulverização manual com lança/pistola ou pulverização manual com mochila em estufas.

## Dosagem e instruções de utilização


CULTURA	PRAGA	DOSAGEM
Tomate (ar livre / estufa)	Mosca branca	150-225 ml/hl (0,9-1,5 L/ha)
Pimento (ar livre / estufa)	Pulgões	120-180 ml/hl (0,7-1,2 L/ha)
Alface (ao ar livre)	Pulgões	150-200 ml/hl (0,7-1,5 L/ha)
Beringela (ao ar livre / estufa)	Mosca branca	150-225 ml/hl (0,9-1,5 L/ha)
Espinafres (ao ar livre)	Pulgões	150-200 ml/hl (0,7-1,5 L/ha)
Alface-de-cordeiro, escarolas, endívias, agriões e outros rebentos, bérberis, rúcula ou foguete, mostarda chinesa, rebentos (incluindo as espécies brássicas), beldroegas, acelgas, folhas de videira e espécies semelhantes, agriões, chicórias	Pulgões	150-200 ml/hl (0,7-1,5 L/ha)
Videira (uvas de mesa e de vinho)	<i>Scaphoideus titanus</i>	250 cc. ml/hl
Oliveira (variedades de azeite e de azeitona de mesa)	<i>Prays oleae</i>	250 cc. ml/hl
Okras, quiabos (ar livre / estufa)	Mosca branca	150-225 ml/hl (0,9-1,5 L/ha)

**PERÍODO DE SEGURANÇA:** Entre o último tratamento e a colheita deve decorrer 1 dia, exceto no olival, em que devem decorrer 5 dias.

## Precauções

Não é compatível com produtos muito ácidos ou muito alcalinos. Por ser um produto fotossensível, recomenda-se a sua utilização em horas de baixa luminosidade, de preferência ao entardecer ou ao amanhecer e com temperaturas do ar não inferiores a 5°C e não superiores a 30°C. KENPYR é um produto que, em diluições adequadas, não produz fitotoxicidade. Não é tóxico, mas deve evitar-se o contacto com os olhos. Não ingerir.

## Apresentação



AGRICULTURA ECOLÓGICA

Produto utilizável na agricultura biológica de acordo com o Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos.

Inscrito na lista FiBL Input List (Espanha). Produto adequado para utilização no âmbito da Norma de certificação Demeter/Biodinâmica

Bioestimulantes Agrícolas S.L. C/ Jaime I, 8. 46560 Massalfassar (Valencia) Espanha. Telf: +34 961417069 - [biagro@biagro.es](mailto:biagro@biagro.es)