

# MIXFOL

AMINOÁCIDOS DE ORIGEM VEGETAL  
PARA APLICAÇÃO FOLIAR E FERTIRRIGAÇÃO

pH: 6,5



## Caraterísticas

O MIXFOL é um bioestimulante avançado com uma elevada concentração de aminoácidos livres de origem vegetal, de rápida assimilação, que favorece a síntese de proteínas, reativando o metabolismo da planta e aumentando o rendimento, especialmente durante períodos de stress abiótico (temperaturas elevadas ou baixas, seca, etc.) e nas fases fenológicas mais delicadas (floração ou colheita excessivas).

O MIXFOL é recomendado para todos os tipos de culturas hortícolas, frutíferas, citrinos, videiras, oliveiras, cereais e plantas ornamentais, em qualquer fase do seu ciclo de crescimento, tanto por aplicação foliar como por fertirrigação e hidroponia.

## Riqueza garantida

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Aminoácidos totais .....   | 20,0% p/p |
| Aminoácidos livres .....   | 14,0% p/p |
| Azoto (N) total .....      | 8,0% p/p  |
| Azoto (N) amoniacal .....  | 4,2% p/p  |
| Azoto (N) orgânico .....   | 3,8% p/p  |
| Carbono (C) orgânico ..... | 20,0% p/p |

## Dosagem e instruções de utilização

### ÁRVORES FRUTÍFERAS E CÍTRICOS

**Foliar:** 200 - 300 cc/hl.

**Fertirrigação:** 3 - 5 L/ha.

Efetuar 2 a 4 aplicações na pré-floração, queda das pétalas e frutificação. Pode também ser utilizado em qualquer outro momento em que se pretenda potenciar o desenvolvimento da árvore ou do fruto.

### HORTÍCOLAS

**Foliar:** 200 - 300 cc/hl.

**Fertirrigação:** 3 - 5 L/ha.

Efetuar várias aplicações ao longo de todo o ciclo vegetativo, especialmente na pré-floração, na frutificação e na mudança de cor, bem como em culturas semeadas no outono e sensíveis ao frio.

## Dosagem e instruções de utilização

### HORTÍCOLAS DE BULBO E TUBÉRCULOS

**Foliar:** 200 - 300 cc/hl.

**Fertirrigação:** 3 - 5 L/ha.

Aplicar no início da formação do bulbo ou tubérculo. Repetir 20 - 25 dias depois.

### OLIVEIRA

**Foliar:** 200 - 300 cc/hl.

**Fertirrigação:** 3 - 5 L/ha.

Aplicar nos períodos de pré-floração e de frutificação.

### MORANGO

**Foliar:** 200 - 300 cc/hl.

**Fertirrigação:** 3 - 4 L/ha.

Aplicar nos períodos de pré-floração e de frutificação.

### CEREALÍDEAS


**Foliar:** 3 - 5 L/ha.

Aplicar na fase de rebentos, com um volume de pulverização mínimo de 200 L/ha. Podem ser realizadas mais aplicações com a mesma dose sempre que se pretenda fornecer um aporte nutricional e energético à cultura.

## Precauções

É compatível com a maioria dos produtos fitossanitários de uso comum, exceto os à base de cobre e os óleos.

## Apresentação



AGRICULTURA ECOLÓGICA

Produto utilizável na agricultura biológica de acordo com o Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos.

Inscrito na lista FiBL Input List (Espanha). Produto adequado para utilização no âmbito da Norma de certificação Demeter/Biodinâmica